



白線斑蚊



埃及斑蚊

登革熱防制

感染登革熱以後有沒有免疫力呢？

感染某一型登革病毒的患者，對該型病毒具有終身免疫，而對其他型別僅具有短暫的免疫力，之後還有可能再感染其他型別。例如以前曾得到第I型登革熱，以後就不會再得到第I型登革熱，但有可能得到第II、III、IV型等三型登革熱。

登革熱處理四絕招

巡

巡視家戶內外積水容器

倒

倒掉積水、倒蓋容器

清

清除廢容器並分類回收

刷

刷除殘留的斑紋蟲卵

什麼是登革熱？

登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，登革熱依抗原性可分為I、II、III、IV型等四種型別，臨床症狀主要為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀；臺灣位於亞熱帶地區，像這樣有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，為登革熱流行高風險地區。

臺灣傳播登革熱的病媒蚊有哪些種類？

臺灣地區傳播登革熱的病媒蚊為斑蚊屬，特徵是身體黑色，腳上有白斑，主要是埃及斑蚊和白線斑蚊兩種。其中埃及斑蚊成蚊喜歡棲息於室內；白線斑蚊大多棲息於室外。

資料來源：衛生福利部疾病管制署

感染方式為何？

登革熱的感染方式主要是藉由病媒蚊叮咬人時將登革病毒傳入人體內。

潛伏期有多久？

潛伏期為3-14天，通常為4-7天。

什麼是登革熱警示徵象？

腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血、月經血過多等)，嗜睡或躁動不安等症狀，一般都是出現於發病後三至七日間，一旦出現這些症狀，必須馬上就醫。

如何正確使用防蚊藥品？

如果在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，亦可使用防蚊藥品，並建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。

一般來說，較高濃度防蚊藥品能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦了。

感染到登革熱如何治療及預防？有無疫苗？

登革熱目前沒有特效藥物可治療，一般採行支持性療法，請遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。

在國內尚未有安全有效的登革疫苗核准上市前，建議民眾應加強自身的防蚊措施，並積極清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生才是防治登革熱的根本之道。

聲明：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷，若有身體不適的情況發生，請您盡速就醫，以免延誤病情！