

認識狂犬病

致病原

狂犬病毒 (rabies virus) 是一種桿狀病毒，Lyssavirus 屬。所有這一屬的病毒抗原皆相近，但使用單株抗體或核酸排序，可以區別源自不同地區或動物的病毒。

傳染方式

患有狂犬病之動物，其唾液中含有病毒，狂犬病病毒即從已感染動物的唾液中隨著抓、咬所造成之傷口而進入人體（少數經由皮膚剛受傷的傷口、黏膜）。因動物會舔牠們的腳，故被感染狂犬病的動物爪子抓傷也是危險的。人類患者之唾液也有病毒，理論上人與人之間的直接傳染是有可能的，但至今尚無病例報告。亦曾發生死於中樞神經疾病病患，經角膜捐贈，傳染狂犬病至受贈者。蝙蝠群居的山洞或進行病毒培養的實驗室也有可能經空氣傳染，不過很少見。拉丁美洲常發生吸血蝙蝠傳染至家畜。

潛伏期

通常為1~3個月，短則不到一周，長則一年以上；視傷口嚴重程度、傷口部位神經分布的多寡或與腦的距離、病毒株別、病毒量、衣服的保护程度及其他因素等而定。

傳染期

一般犬、貓自臨床症狀出現前3~7天（很少超過4天）開始，以及整個病程都具傳染力。但報導指出衣索匹亞的狗隻，其狂犬病病毒株自臨床症狀出現前14天即具傳染力。在某一研究中，蝙蝠在臨床症狀出現前12天即可分泌病毒；另一研究顯示，臭鼬在臨床症狀出現前8天即可分泌病毒，在死亡前約可分泌病毒長達18天。

臨床症狀

狂犬病初期呈現症狀為非特異發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等，或抓咬傷部位異樣感之特異性的症狀，持續數天後，出現興奮及恐懼的現象。然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉之痙攣，以致於引起恐水之現象（故又稱恐水症）。隨後併有精神錯亂及抽搐等現象。如果不採取任何醫療措施，患者在2~6天內（有時會更久），常因呼吸麻痺而死亡。

**預防！
狂犬病**

遭狂犬病動物咬傷，
且未即時就醫處理，
狂犬病發病後死亡率會100%。

意外遭咬四秘訣
不慌不亂更心安

請勿逗弄、獵捕、飼養野生動物，
若遭動物咬傷，請依循下列步驟：

1 記  保持冷靜，牢記動物特徵

2 沖  用大量肥皂、
清水沖洗15分鐘，
並以優碘消毒傷口

3 送  儘速送醫評估
是否要接種疫苗

4 觀  儘可能將咬人動物繫留
觀察10天

各縣市都有疫苗儲備醫院，請洽1922防疫專線！

資料來源：衛生福利部疾病管制署

