

認識屈公病

登革熱 VS 屈公病



傳染途徑
埃及斑蚊、白線斑蚊

潛伏期
一般3-8天，最長14天。

常見症狀
突發性高燒(38℃)以上、頭痛、骨節關節痛、肌肉痛、後眼高痛、皮膚出紅疹、噁心、嘔吐、腹痛、倦怠、出血熱

注意事項
如發展為登革熱重症，未及時就醫或治療，死亡率高達20%以上。



傳染途徑
埃及斑蚊、白線斑蚊

潛伏期
一般3-7天，最長12天。

常見症狀
高燒、頭痛、骨節關節痛、肌肉痛、皮膚出紅疹、噁心、嘔吐、倦怠、


注意事項
持續數週的倦怠感，有些病患關節痛到無法行動，並持續數週或數月。



病媒蚊放大鏡

台灣主要傳播登革熱/屈公病的病媒蚊種類

埃及斑蚊



外觀特色

胸部背側有一對彎曲的白線，中間有2條縱線。

1. 喜歡棲息在室內，尤其是深色的窗簾、衣服、布幔及其他陰暗的地方。

2. 因在室內，叮咬人的時間高峰不明顯。

3. 在台灣主要分布的地區是在嘉義布袋以南各縣市。

白線斑蚊



共同特色

腳上都有黑白相間的斑紋，又叫做「花腳蚊」。

外觀特色

胸部背側有一條白線。

1. 喜歡棲息在室外。

2. 一天之中叮咬人的高峰時刻約在日出後1-2小時，及日落前2-3小時。

3. 在台灣主要分布於全島平地及高度1,500公尺以下山區

病媒蚊的生活習性—白天叮人吸血！

動動腦！如何清除孳生源？



屋頂排水溝保持暢通。


室內花盆底盤每週刷洗。



室外花盆底盤要刷洗，最好不要用底盤。



清理廢棄物，勿堆積。




花瓶裡的水要每週換新，也要記得刷洗內壁。

人工水池可養食蚊魚。

石縫間的積水要清除。

樹洞填土或種花。

開飲機水盤、烘碗機及冰箱底盤每週刷洗勿積水。



萬年青、黃金葛改變種植方式。



寵物的飲用水盤每週要刷洗。

1. 清除積水或凹地填土。
2. 輪胎打洞或填土或清除。
3. 澆花容器不用時要倒置。
4. 使用中的水桶要加蓋。



儲水水缸加蓋。

長期外出，馬桶蓋及水箱蓋都應蓋上。

資料來源：衛生福利部疾病管制署



致理科技大學
Chihlee University of Technology

聲明：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷，若有身體不適的情況發生，請您盡速就醫，以免延誤病情！

「環安處 關心您」

職業衛生護理師 編撰