

# 性傳染病防治： ~梅毒~

## 晚期梅毒：三期梅毒症狀

三期梅毒：感染後3至7年

- 梅毒腫：好發於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織
- 心臟血管性梅毒：主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤
- 神經性梅毒：無症狀之神經性梅毒、腦膜血管性梅毒以及腦實質性梅毒

## 什麼是性傳染疾病？

性傳染疾病 (Sexually Transmitted Diseases · STD)  
是指透過「**性接觸**或**血液接觸傳染**」的疾病。

\* 陰道交、肛交、口交及皮膚黏膜親密接觸、磨擦損傷、體液交換等，都算「性接觸」！



除了性接觸  
性傳染疾病  
也會透過這些  
方式傳染



血液傳染



母子垂直感染

可以透過**性接觸傳染**的疾病非常多種！

千萬不能輕忽！！

你可能聽過這些疾病...也會發生在一般年輕人身上~

生殖器疱疹、菜花  
淋病、梅毒、愛滋  
B、C、D型肝炎

這些疾病也可能透過**性接觸傳染**：

A型肝炎  
M痘  
茲卡病毒感染症



## 早期梅毒：一期梅毒症狀

一期梅毒：感染後2~4週或更久

1) 硬性下疳

- 男性陰莖龜頭、冠狀溝及肛門口周圍
- 女性陰唇或肛門區域

2) 局部淋巴腺腫大：無壓痛感，堅實似橡皮



資料來源：1. 衛生福利部疾病管制署 梅毒防治網 <https://www.cdc.gov.tw/Categories/Pages/20152542444020m07p0>  
2. 2019 衛生福利部疾病管制署 梅毒防治網

## 如何預防性傳染病？

★ 黃金定律：預防勝於治療 ★

1. 安全性行為：每一次都要**全程正確使用保險套**，使用**水性**潤滑液。
2. 避免**乒乓球式傳染**：夫妻或性伴侶務必【**同時檢驗或治療**】
3. 不共用衛生物品：如刮鬍刀等
4. 定期接受性病篩檢：風險族群、**不安全性行為或性接觸者**
5. 維持**單一固定性伴侶**
6. **勿共用針頭、針具或稀釋液**



資料來源：衛生福利部疾病管制署 性病防治網 梅毒防治網  
<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/2-9918CmWVMSRkUbnEwG8W8K85D5a7M0QWedT5T9TBM7Jk0z0Cv9>

## 不要輕忽~~感染性傳染疾病的嚴重性

性傳染疾病可能產生的後果，可能超出疾病本身的直接影響！

疱疹、淋病和梅毒等性傳染病感染 → 會增加感染**愛滋病毒**的風險

淋病和披衣菌感染 → 可能導致**女性骨盆腔發炎**和**不孕症**

梅毒透過**母嬰垂直傳染** →  
可致死產、新生兒死亡、低出生體重、早產、敗血症等



## 常見的性傳染疾病：梅毒

◆ 梅毒屬於第三類傳染病，要一週內通報

□ 潛伏期：10-90天，通常約3週

□ 傳染期：早期（第一、二期）最具有傳染性

□ 臨床症狀：

- 早期梅毒：性器官出現**無痛性潰瘍**與**硬性下疳**（無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出）。
- 若不接受治療，會出現**全身性症狀**，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛的現象。



梅毒

## 早期梅毒：二期梅毒症狀

二期梅毒：感染後3至5個月



• 梅毒螺旋體進入血液循環發生**菌血症**

- **全身性紅疹**
- 也出現在**手掌及腳掌**，通常不會癢
- 可能發展成**灰白色扁平濕疣**
- **全身性淋巴腺腫**
- **神經系統問題**



## 什麼時候該進行篩檢？

1. 過去曾**感染過**性傳染病

2. 您或**性伴侶**曾有「**風險性行為**」：

- 與不特定人發生**性行為**、
- 使用**成癮性藥物**、
- **多重性伴侶**、
- 性行為過程**未正確使用保險套**

3. 性器官出現**任何病灶**皆須尋求醫師評估檢查



資料來源：衛生福利部疾病管制署 性病防治網 梅毒防治網  
<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/1e59WbCmWVMSRkUbnEwG8W8K85D5a7M0QWedT5T9TBM7Jk0z0Cv9>

聲明：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷，若有身體不適的情況發生，請您盡速就醫，以免延誤病情！